

WYNIK BADANIA ULTRASONOGRAFICZNEGO

Jama brzuszna, ID:A.B

Kraków, dnia 2014-01-29

Aparat: Producent - GE, Model - VOLUSON 730 EXPERT, Głowica - RAB 2-5L

Imię i nazwisko: Michał Siemaszko

Data urodzenia 1979-02-07, lat 34

Wątroba

Wielkość: niepowiększona. Obrysy: regularne (gładkie). Echogeniczność wątroby: normoechogeniczna. Pień i gałęzi żyły wrotnej: prawidłowa szerokość i przebieg. Drogi żółciowe wewnątrzwątrobowe: nieposzerzone. Przewód żółciowy wspólny: nieposzerzony. Tętnica wątrobowa wspólna: prawidłowa szerokość i przebieg. Żyłki wątrobowe: prawidłowa szerokość. Płat ogoniasty: prawidłowy. Okolica wątroby: prawidłowa. Ocena wnęki prawidłowa.

Zmiana(y) ogniskowa(e): nie stwierdzono

Wnioski diagnostyczne: wątroba prawidłowa

Pęcherzyk żółciowy

Wielkość: prawidłowa. Ściana: prawidłowej grubości. Zawartość: bezechowa .

Wnioski diagnostyczne: Prawidłowy pęcherzyk żółciowy

Trzustka

Wielkość: prawidłowa. Echogeniczność: normoechogeniczna. Obrysy: prawidłowe . Przewód Wirsunga: nieposzerzony.

Wnioski diagnostyczne trzustka prawidłowa

Śledziona

Wielkość: prawidłowa. Echogeniczność: normoechogeniczna. Wnęka: prawidłowa .

Przestrzeń zaotrzewnowa

Aorta brzuszna: szerokość prawidłowa, budowa ściany prawidłowa, przebieg prawidłowy. Żyła próżna dolna: podatna na ucisk, budowa i przebieg prawidłowe. Odejście pni dużych naczyń: prawidłowe .

Przestrzeń zaotrzewnowa: prawidłowa

Nerka prawa

Wielkość prawidłowa. Lokalizacja: typowa. Granice: regularne . Echogeniczność miąższu nerek w porównaniu z echogenicznością miąższu wątroby: niższa niż miąższ wątroby, jednorodna. Bez cech zastoju.

Nerka lewa

Wielkość prawidłowa. Lokalizacja: typowa. Granice: regularne . Echogeniczność miąższu nerek w porównaniu z echogenicznością miąższu wątroby: niższa niż miąższ wątroby, jednorodna. Bez cech zastoju.

Nadnercza

Pola nadnerczowe: bez zmian

Pęcherz moczowy

Prawidłowy. Zawartość: bezechowa.

Zaleganie po mikcji ok. 390ml !!!

Gruczoł krokowy

Wymiary: szerokość 29 mm, wysokość: 19 mm, strzałkowy: 24 mm

Gruczoł krokowy o gładkich obrysach, normoechogeniczny, bez zmian ogniskowych.

Inne materiały: Nie uwidoczniło wolnego płynu w jamie brzusznej.

Zalecenia: Pilne ogólne badanie moczu i konsultacja urologa.

Wnioski: Duże zaleganie moczu po mikcji.

W wywiadzie dolegliwości dysuryczne od kilku tygodni, nie gorączkuje.

dr n. med. Joanna Jędrus
specjalista chirurgii ogólnej
tel. 600-394-247
PWZ 1304038

